傷寒總病論

附札記

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

傷寒總病論

附札記

（一）

龐安時撰

本館據士禮居叢書本排印初編各叢書僅有此本

啓久不爲問思企日深過辱存記遠枉書教具聞起居佳勝感慰兼集惠示傷寒論眞得古聖賢救人之意豈獨爲傳世不朽之資蓋已義貫幽明矣謹當爲作題首一篇寄去方苦多事故未能便付去人然亦不久作也老倦甚矣秋初決當求去未知何日會見臨書惘惘惟万万以時自愛不宣　再拜

安常處士閤下

五月廿八日

人生浮脆何者爲可恃如君能著書傳後有幾念此便當爲作數百字仍欲送杭州開板也知之知之

又白

目錄

（以前原缺一葉半）

結胸證 大陷胸湯 大陷胸丸 小陷胸湯 三物白散方

心下痞證 半夏瀉心湯 大黃黃連瀉心湯 生薑瀉心湯 甘草瀉心湯 加附子瀉心湯

陽毒證 升麻湯

陰毒證 甘草湯 反陰丹 硫黃丸 附子飲子

狐惑證 赤小豆當歸散

百合證 百合知母湯 滑石代赭湯 百合雞子湯 百合地黃湯 百合湯 栝樓牡蠣散 百合滑石散

痓濕暍等證

痓證 葛根麻黃湯

濕證 黃耆湯 杏人薏苡湯 桂枝附子湯 甘草附子湯

暍證 瓜蒂湯 小橘皮湯

發汗吐下後雜病證

茯苓桂枝湯　檳榔散　五味子湯
乾薑附子湯　茯苓白朮湯　梔子香豉湯
梔子生薑湯　梔子厚朴湯
柴胡桂枝湯　旋復花代赭湯　梔子乾薑湯
赤石脂禹餘粮湯　桂枝人參湯　柴胡龍骨牡蠣湯
黃芩梔子湯　葱白湯　厚朴人參湯
荊芥散　理中丸　葛根葱白湯
茅根湯　黃芩芍藥湯　生薑半夏湯
薤白梔子湯　黃連黃檗湯　黃連當歸湯
麝香丸　肉豆蔻湯　黃連熟艾湯
大青湯　苦葶藶湯　良薑湯
地黃湯　黃芩湯　麻人龍膽丸
大黃梔子湯　秦皮大黃湯　大黃散
雄黃散　青黛丸　滴哏湯
黃㖞升麻湯　薔微飲子　搴馬丸
五倍子散　射干煎　黃檗飲子
黑龍煎　喉閉膏　鵬砂散
升麻大黃湯

傷寒勞復證　葛根薑豉湯
枳實梔子湯　桂枝梔子湯
梔子石膏香豉湯　附子黃耆湯　瓜蔞湯
鼠矢湯　蘆根湯

第四卷

陰陽易證　炙附　足甲髑灰散　瘕頭
毛際

暑病論

暑病表證 代葛根證 代麻黃證 代青龍證
代葛根麻黃證 大青消毒湯 葛粉散
素問載五種暑病 無方
時行寒疫論
時行寒疫治法 趙泉黃膏 崔文行解散 藜蘆散
葛根解肌湯 鄰子湯 白薇散 麻黃葛根湯 麻黃湯
華佗赤散 烏頭赤散 聖散子方并序
班豆方論
溫病發班治法 小兒證附
地黃膏 黃芩麻黃湯 香豉石膏湯
黃連 漏蘆湯 樗皮飲子
五香湯 水解散 葛根石膏湯
蔔金散 鱉甲湯 紅花漉飲子
麻黃甘草湯 紅花湯 甘草乾薑湯
紫草湯 甘草湯 犀角升麻湯
油飲子 瘧巴出定方 三豆飲子
梔子薤豉湯
第五卷
天行溫病論
辟溫疫方論 蘇合酒 辟溫粉
四海神名 附子散 研雄黃井硫法
蠶丸丸一名冠星丸 一名武威丸 除瘟術 殺鬼丸

青筋牽證 柴胡地黃湯　石膏竹葉湯
赤脈攢證 石膏地黃湯
黃肉隨證 灸法附　玄參寒水石湯
白氣貍證 石膏杏人湯　石膏蒺白湯
黑骨溫證 灸法附　苦參石膏湯　知母解肌湯
溫病噦方論 茅根葛根湯　梓皮飲子　茅根橘皮湯
枇杷茅根湯　萎蕤湯
黃病證 爰煎消石礬石散　瓜下散
傷寒感異氣成溫病壞後及瘧證 知母石膏湯
丹砂丸
白虎加桂枝湯
三黃石膏湯　石膏甘草散
敗壞別行方 附子鱉甲湯　木通桂枝湯　鱉甲恒山湯
鱉甲犀角湯　風引加附子湯
小兒傷寒證 葛根芍藥湯　蕩涎散　射干湯　虵皮湯
麝根湯　甜葶藶湯　犀角黃耆湯　鉤藤大黃湯

第六卷

傷寒雜方 時雨散　玄精石湯　瓜蒂牙消散
麻黃杏子湯　朴消散　犀角五香湯
妊娠雜方 仆龍肝散　吞雞子法　牽牛散
黃耆人參湯　阿膠散　陳皮枳實湯

鹿角屑湯　益母草飲子
地黃生薑飲子　紅花散　生薑小便飲子　大黃桃人湯　石膏栝樓湯
傷寒暑病通用刺法　期門　肺腧　大杼　手少陰　勞宮
開元　中院　大杼　曲池　魚際
大淵　太都　太白　復溜　合谷　丘墟
列缺　商陽　天柱　涌泉　狹谿　陷谷
傷寒死生候
熱病死生候
溫病死生候
天行差後禁忌
解仲景脈說　半夏桂枝甘草湯
解華佗內外實說
辨論
與有位辨傷寒論書
惣論音訓
脩治藥法

傷寒總病論卷一

宋　歸水龐安時撰

敍　論凡言龐曰・其下有注・皆安時言・

陽明證　太陽證

太陰證　少陽證

厥陰證　少陰證

三陰三陽傳病證　兩感證

敍論

龐曰．素問云、冬三月是謂閉藏．水冰也地裂．無擾乎陽．又云、彼春之暖．爲夏之暑．彼秋之忿．爲冬之怒．是以嚴寒冬令爲殺厲之氣也．故君子善知攝生．當嚴寒之時．周密居室而不犯寒毒．其有奔馳荷重．勞房之人．皆辛苦之徒也．當陽氣閉藏．反擾動之．令鬱發腠理．津液強潰．爲寒所搏．膚湊反密．寒毒與榮衞相渾．當是之時．勇者氣行則已．怯者則著而成病矣．其即時成病者．頭痛身疼．肌膚熱而惡寒．名曰傷寒．其不即時成病．則寒毒藏於肌膚之間．至春夏陽氣發生．則寒毒與陽氣相搏於榮衞之間．其患與冬時即

病候無異因春温氣而變名曰温病也因夏暑氣而變名曰熱病也因八節虛風而變名曰中風也因暑濕而變名曰濕病也因氣運風熱相搏而變名曰風温也其病本因冬時中寒隨時有變病之形態爾故大醫通謂之傷寒焉其暑病濕温風温死生不同形狀各異治別有法

龐曰天寒之所折則折陽氣足太陽爲諸陽主氣其經夾脊膂貫五臟六府之膸上入腦故始則太陽受病也以其經貫五臟六府之膸故病有臟府傳變之候以其陽經先受病故次第傳入陰經以陽主生故足太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪以陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至第六七日當傳足厥陰肝木必移氣克於脾土脾再受賊邪則五臟六府皆危殆矣榮衞不通耳聾囊縮不知人則死速用承氣湯下之（方在可下證中）則可保五死一生勿從容拯溺令病人水漿不入湯液不下無可柰何也素問云脾熱病則五臟危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脈得微緩微浮其證寒熱似瘧此爲必愈宜桂枝麻黄各半湯和之（方在可汗證中）微緩微浮爲脾胃脈也故知脾氣全不再受克邪無所容否極泰來榮衞將復水升火降則寒熱作而大汗解矣人將大汗必冒昧者若久旱天將時雨六合皆至昏昧雨降之後草木皆蘇庶物明淨玉册所謂換陽之吉證也

王叔和云土地温涼高下不同物性剛柔餐居亦異是以黄帝與四方之問岐伯立四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜兩審之

龍曰．叔和非醫之圓機．孰能臻此也．如桂枝湯自西北二方居人四時行之．無不應驗．自江淮間地偏暖處．唯冬及春可行之．自春末及夏至以前．桂枝麻黃青龍內宜黃芩也．自夏至以後．桂枝內故須隨證增知母、大青、石膏．升麻葛根取汗也．若時行寒疫及病人素虛寒者．正用古方．不在加減矣．夏至以後．雖宜白虎．詳白虎湯自非新中暍而變暑病．乃汗後解表藥耳．一白虎未能駈逐表邪故也．或有冬及始春．寒甚之時．人患斯疾．因汗下偶變狂躁不解．須當作內熱治之．不拘於時令也．南方無霜雪之地．不因寒氣中人．地氣不藏．蟲類泄毒．嵐瘴間作．不在此法．治別有方也．又一州之內．有山居者．爲居積陰之所．盛夏冰雪．其氣寒腠理閉．難傷於邪．其人壽．其有病者多中風中寒之疾也．有平居者．爲居積陽之所．嚴冬生草．其氣溫．腠理疎．易傷於邪．其人夭．其有病者多中濕中暑之疾也．凡人稟氣各有盛衰．宿病各有寒熱．因傷寒蒸起宿疾．更不在感異氣而變者．假令素有寒者．多變陽虛陰盛之疾．或變陰毒也．素有熱者．多變陽盛陰虛之疾．或變陽毒也．

龍曰、四時之中．有寒暑燥濕風火相搏．喜變諸疾．須預察之．其飲食五味禽魚蟲菜果實之屬．性偏有嗜者．或金石草木藥素嘗有餌者．人五臟有大小、高下、堅脆、端正偏傾．六府亦有大小、長短、厚薄、緩急．令人終身長有一病者．貴者後賤．富者乍貧．有常貴．有常富．有暴富．有暴貧．有暴樂．有暴苦．有始樂後苦．有離絕蘊結．憂恐喜怒者．夫常貴後賤．名曰脫營．常富後貧．名曰失精．暴樂暴苦．始樂後苦．精竭體沮．脫勢候

王精神內傷情慕尊貴妄爲喪志始富後貧焦皮擊筋常富惡勞驕墮精消離間親愛者魂遊絕所懷者意喪所慮者神勞結怨恨者志苦憂愁者閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者蕩憚而不收喜樂者撣散而不藏此皆非外邪所中而得之於內也良工必預審問其由先知臟府經絡受病之所可舉萬全工不思曉令五臟六府血氣離守迫至不救又何言哉

龐曰陰陽虛盛者非謂分尺寸也榮衞者表陽也腸胃者裏陰也寒毒爭於榮衞之中必發熱惡寒尺寸俱浮大內必不甚躁設有微煩其人飲食欲溫而惡冷謂陽虛陰盛也可汗之則愈若誤下則死也若寒毒相薄於榮衞之內而陽勝陰衰極陰變陽寒盛生熱熱氣盛而入裏熱毒居腸胃之中水液爲之乾涸燥糞結聚其人外不惡寒必蒸蒸發熱而躁甚則讝語其脈浮滑而數或洪實或汗後脈雖遲按之有力外證已不惡寒腹滿而喘此皆爲陽盛陰虛當下之則愈若誤汗則死也仲景載三等陽明是陽盛陰虛證矣調經論云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒以此別之若陰獨盛而陽氣暴絕必四肢逆冷臍築湊痛身疼如被杖面青或吐或利脈細欲絕名曰陰毒也須急灸臍下服以辛熱之藥令陽氣復生澉然汗出而解若陽獨盛而陰氣暴絕必發躁狂走妄言面赤咽痛身班班如錦文或下利赤黃脈洪實或滑促名曰陽毒也宜用針泄熱服以苦酢之藥令陰氣復生澉然汗出而解也

龐曰夫邪逆陰陽之氣非汗不能全其天眞素問云辛甘發散爲陽謂桂枝甘草細辛薑棗附子之類能

復陽氣也。酸苦湧泄爲陰。謂苦參、大青、葶藶、苦酒、艾之類。能復陰氣也。酸苦之藥。既折熱復陰。亦當小汗而後利者。經云。身汗得而後利。則實者可活是也。

華佗治法云。傷寒病起自風寒。入於腠理。與精氣分爭。榮衞否鬲。周行不通。病一日至二日。氣在孔竅皮膚之間。故病者頭痛惡寒。身熱。腰背強重。此邪氣在表。隨證發汗則愈。

麗曰。凡發汗須如常覆腰以上。厚衣覆腰以下。以腰足難取汗故也。半身無汗。病終不解。凡發汗後。病證仍存。於三日內。可二三發汗。令腰脚周遍爲度。若病不解。便可下之。設令下後不解。表裏邪亦衰矣。足觀脈證調治。七日內可期正汗爲善也。發汗後不可再行汗者。始發熱惡寒。今不惡寒。但倍發熱而躁。始脈浮大。今洪實。或沈細數。始惺靜。今狂語。此胃實陽盛。再行汗藥。卽死。須當下之。有人始得病變陽盛之證。須便下之。不可拘日子深淺次第也。病三日以上。氣浮上部。塡塞胸心。故頭痛胸中滿。或多痰涎。當吐之則愈。

麗曰。若虛損及新產人。不能吐者。可服枳實散。（枳實細末。米飮調貳錢。日可三四服。）若有虛寒。手足冷及脈微弱者。枳實貳兩加桂枝壹兩同末之。如前服。

病五六日以上。氣結在臟府。故腹滿身重。骨節煩疼。當下則愈。若小便少。手足心幷腋下不滋潤。尙未可攻之。當消息其候。不可亂投湯藥。虛其胃氣也。（以上解華佗治法。）

太陽證

尺寸俱浮者。太陽受病也。一二日發。以上連風府。故頭項痛而腰脊強。此是太陽膀胱經屬水。病源云小腸者。非也。

太陽病發熱。汗出惡風。其脈緩者名爲中風。太陽病或已發熱。未發熱。必惡寒體痛。脈陰陽俱緊者名爲傷寒。

傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。爲不傳。頗欲吐。若煩躁。脈數急者。爲傳也。

傷寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。病發熱而惡寒。邪發於陽也。不熱而惡寒者。邪發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。陽數七陰數六故也。發於陽者。隨證用汗藥攻其外。發於陰者。用四逆輩溫其內。

太陽病、頭痛至七日以上自愈者。其經竟故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳。補足陽明土三里穴也。

風者解表而不了了者。十二日愈。方言曰。南楚疾愈或謂之差。或謂之了。

太陽病初服桂枝湯。反煩不解。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。

太陽病自汗。四支難以屈伸。若小便難者。可與陽旦證內加附子壹枚。炮去皮尖。八破同煎服之。陽旦即桂枝湯異名

若小便數者。愼不可行此湯。宜用芍藥甘草湯。若誤行桂枝附子湯攻表。則咽乾煩躁。厥逆嘔吐者。作甘草乾薑湯與之。以復陽氣。若厥愈足溫。更與芍藥甘草湯。其脚卽伸。若胃氣不和。讝語者。少與調胃承氣湯。微溏則讝語止。

芍藥甘草湯主脈浮而自汗小便數寸口脈浮大浮爲風大爲虛風則生微熱虛則兩脛攣小便數仍汗出爲津液少不可誤用桂枝湯宜補虛退熱通治誤服湯後病證仍存者按古之叁兩准今之壹兩古之叁升今之壹升若以古方裁減以合今升秤則銖兩升合之分毫難以從俗莫若以古今升秤均等而減半爲一劑稍增其枚粒乃便於俗耳且仲景方云一劑盡病證猶在者更作減半之劑此古方一劑入加其半庶可防病未盡而服之也有不禁大湯劑者再減半亦得肘後所謂或以壹分爲兩或以貳銖爲兩以盡當升可也貧家難辦或臨時抄撮皆可麩末每抄五錢水兩平盡煎八分服之有渣滓者每服入渣三片棗三枚一日三服未中病可六七服也有不可作煮散者是病勢大宜依古方行之凡湯一劑有附子一枚增半之劑合用附子一枚半古方不析枚者是枚力要完也半兩以上大附子可當一枚半四錢以下者可用兩枚爲准枚傷多不妨仲景云强人可加附子成兩枚是也

芍藥 甘草 各貳兩

細剉水壹升半煎七合半去滓溫溫分再服

甘草乾薑湯

甘草 貳兩 乾薑 壹兩

煎如前方

調胃承氣湯

大黃 壹兩 甘草 半兩 芒消 壹大合

細剉水壹升煎上二味至五合去滓下芒消烊化暖服壹盞微溏爲度如難利者再與一劑

太陽病汗證反下之遂利不止脈促表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯主之

黃芩 叁錢　黃連 叁兩　甘草 半兩　乾葛 貳兩

細剉。水壹升半。煎七合半。去滓。溫飲壹盞。日三服。

陽明證

尺寸俱長者。陽明受病也。當二三日發。以其脈夾鼻絡於目。故身熱目痛鼻乾。不得臥。此證惡寒可發汗。若惡寒罷。反自汗惡熱者。爲胃家實。屬正陽明。宜調胃承氣湯。方在太陽證下。

麗曰。有三陽陽明者。其太陽陽明本太陽病。若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明也。少陽陽明者。本傳到少陽。因發汗利小便已。胃中燥。大便難也。正陽陽明者。病人本風盛氣實。津液消鑠。或始惡寒。汗出多。寒罷而反發熱。或始得病便發熱狂言也。

凡陽明證俱宜下。唯中寒惡寒爲病在經。與太陽合病屬表。可發其汗。

二陽合病。脈必浮大而長。外證必頭痛腰疼。肌熱目疼鼻乾也。浮大者。太陽受病也。長者。陽明也。頭、腰、太陽也。肌目鼻、陽明也。

二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漐漐汗出。大便難而讝語者。大承氣湯下之則愈。方在可下證中。

二陽併病。太陽初得時。發其汗。汗先出復不徹。因轉屬陽明。自徹汗不惡寒。若太陽證不罷。不可下。下之爲逆。如此者。可小發其汗。設面色正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。蒸之。若汗出不徹。當短息不足。言陽氣

怫鬱不得越當汗出而不汗其人短氣但坐以汗出不徹故也宜麻黃湯更發其汗卽愈何以知其汗不徹其脈澁故知也方在可汗證中古本字多差誤以從來所見病人證候中符合如此故改正陽明病能食爲中風不能食爲中寒

陽明病中寒脈浮無汗其人必喘發汗則愈宜麻黃湯方在可汗證中

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解發汗則愈宜桂枝湯方在可汗證中若不惡寒爲外欲解手足濈然汗出者大便已鞕宜大承氣湯方在可下證中

陽明病有不可攻者謂陽明病心下鞕滿者不可攻攻之利不止者死利止者愈

陽明病或發汗或自汗大便雖鞕小便少者未可攻津液恐還入胃必先鞕後溏也小便自如乃可攻之

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒其脈浮緊若下之則腹滿小便難也此證必無汗與後證相似且惡寒無汗爲異以知乾腹滿亦不宜正與汗藥別與消詳也

陽明病脈浮而緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒而反惡熱身重若發汗則煩躁憒憒反譫語若加温針必怵惕煩躁不得眠若下則胃中空虛客氣動膈心中懊憹苦生舌上者梔子香豉湯主之

肥梔子拾枚　香豉貳合

水貳升煮梔子減半下豉再煮捌合去滓温服壹盞得快吐者止後服

脈浮緊必無汗而反有汗咽燥腹滿惡熱法當下之而又脈浮緊不當下此恐變風温宜細詳

陽明病口鼻燥但漱水而不欲嚥者必衄

少陽證

尺寸俱弦者少陽受病也當二三日發以其脈上循脇絡於耳故胸脇痛而聾（足少陽膽屬木弦者細長曰弦非謂此弦脈也凡傷寒脈浮緊相載皆屬弦之類也有屬太陽有屬陽明者少陽正得弦脈體是小弦長大脈也多宜和表鮮有汗證）

少陽之證口苦咽乾目眩也

此三陽經皆病未入於藏可汗而解（仲景少陽證唯小柴胡乃和表藥耳）

弦細頭痛發熱屬少陽宜小柴胡湯不可發汗發汗則讝語此屬胃胃和則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯此屬少陽陽明證也（方在太陽證中）

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下脈緊者小柴胡湯主之（少加牡蠣）

若已吐下發汗溫針讝語小柴胡湯證罷此爲壞病知犯何逆以法治之（知犯何逆者犯四種溫病壞候也方在和表證中）

少陽中風兩耳微聞目赤胸中滿而煩不可吐下吐下則驚悸小柴胡湯主之

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡合目則汗（不言弦者隱於長大也）

三陽合病面垢讝語腹滿身重不能轉側遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者宜白

虎湯。方在厥陰證中。

傷寒四五日。或六七日。無大熱。其人躁悶。此爲陽去入陰也。

傷寒三四日。陽爲盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此爲三陰不受邪也。病到陰必吐利。

傷寒三日。少陽脈小者。欲愈也。小而平勻者也。

太陰證

尺寸俱沈細者。太陰受病也。當四五日發。其經布胃中。絡於嗌。故腹滿而嗌乾。宜大承氣湯下之。方在可下證中。

太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸下結鞕。自利不渴者。屬太陰。其藏有寒故也。當溫之。以四逆輩。

傷寒三日。太陽脈弱。至四日。太陰脈大。脈大而胸滿多痰者。宜吐之。無此證者。宜汗之。傷寒脈浮緩。亦大之類。手足自温者。繫在太陰。小便不利者。必發黃。五苓散加茵蔯主之。若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖暴煩下利。日十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。橘皮湯主之。

五苓茵蔯散

以茵蔯濃煎湯。調五苓散貳錢服之。日三四。黃從小便下。以小便清爲度。

橘皮湯

橘皮壹兩　生薑貳兩

細剉。水壹升半。煎七合。去滓。分貳服。稍熱呷。未差。再作服。

本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝芍藥湯主之。

桂枝壹兩半　芍藥叁兩　甘草壹兩　大棗陸枚　生薑壹兩半

咬咀。以水叁升。煮取壹升半。去滓。每温壹盞。日叁服。注云。小建中湯不用飴糖。故芍藥爲君。止痛復利邪故也。

少陰證

尺寸俱沉者。少陰受病也。當五六日發。以其經貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。大承氣湯下之。方在可下證中。

少陰之爲病。脈微細於寸也。

少陰中風。陽微陰浮。爲欲愈也。

凡少陰病四逆者。宜温之。

少陰病始得之。反發熱。脈沉者。麻黄細辛附子湯主之。

麻黄貳兩　細辛貳兩　附子壹枚

咬咀。以水三升。先煮麻黄十數沸。去上沫。內諸藥。煮取壹升。去滓。每温壹盞。日三服。

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微汗。以二三日無陽證。故微發汗也。謂初得病二三日。常見少陰證。無陽者。須發小汗也。

麻黃貳兩　甘草貳兩　附子壹枚

㕮咀。以水叁升。先煮麻黃十數沸。去上沫。內諸藥。煮取壹升半。去滓。每溫一盞。日三服。

龍曰。少陰病脈沉。不知何沉也。且沉緊發汗則動經。沉數爲病在裏。不可發汗。詳此脈或沉而濡。或沉而微。是表中寒而裏不消。脈應裏而發熱在表。故以小辛之藥。溫散而微微取汗也。

少陰病吐利。手足不逆冷。發熱者不死。脈不至者。灸少陰七壯。太谿穴在內踝後跟骨上。動脈陷中。言發熱者。謂其身發熱也。

少陰病吐利煩躁。四逆者死。煩躁者。內煩躁也。與茱萸湯。證宜細審其生死也。

少陰病惡寒而勃。居員切時時自煩。不欲厚衣。宜大柴胡湯。方在可下證中。

少陰病四逆惡寒而自勃。脈不至而吐利煩躁者死。此重詳定。

少陰病下利。利止而眩。時自冒者死。此合是少陽冒昧。汗濈出。脈勻小浮者生。少陰無眩冒之證。

少陰病六七日息高者死。

少陰病脈微細沉。但欲臥。汗出不煩。自欲吐。至五六日自利。復煩躁不得臥寐者死。

少陰病得之二三日以上。心中煩不得臥者。黃連阿膠湯主之。

黃連壹兩　黃芩壹分　芍藥壹分

雞子黃 半枚　阿膠 炙 叁分 爲末

以水貳升先煑三物取壹升去滓內阿膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫溫一盞日三四服

少陰病下利清水色純清心下必痛口乾燥者大承氣湯下之 方在可下證中

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者茱萸湯主之

茱萸 壹兩半 洗三遍 湯　人參 叁分

生薑 壹兩半　大棗 叁個

以水叁勝半煑取壹勝半去滓每温一盞日叁服

少陰病咽痛者桔梗甘草湯主之

桔梗 半兩　甘草 壹兩

細剉水壹勝煎半勝去滓作叁服細呷之

又半夏散亦主之　半夏 湯洗七遍

桂枝 去皮　甘草 炙

右各等分各別搗篩已合治之每服叁錢水壹盞半煎至八分温冷少少嚥之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止

脈不出者通脈四逆湯主之。

甘草 壹兩 附子 大者半個。強人加半個。 乾薑 叁分。強人加壹兩半。

細剉。水叁升。煎至壹升。去滓。每温服一盞。日三四服。未差。急更作一劑。不可作叁散。其脈續續出者愈。暴出者死。面赤者加連須葱四莖去青。腹痛去葱。加芍藥壹兩。嘔者加生薑壹兩。咽痛者去芍藥。加桔梗半兩。利止脈不出者。去桔梗。加人參半兩。病與方皆相應者。乃與服之。

少陰病下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。宜豬苓湯。

豬苓 茯苓 澤瀉 滑石 阿膠 各半兩。

㕮咀。以水貳升。先叁四物。取壹升。去滓。內阿膠末。烊盡。每温一盞服。

少陰病下利。咽痛胸滿心煩。豬膚湯主之。

豬膚 半斤

以水五升。煮取貳升半。去滓。加白蜜半升。白粉貳合半。熬香。和令相得。每温服一盞。日三四服。

少陰病四逆。其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。

甘草 枳實 柴胡 芍藥 各伍分。

擣篩爲細末。白飲和服方寸匕。日三服。欬者加五味子。乾薑炮。各貳分半。幷主下利。悸者加桂貳分

半小便不利者加赤茯苓貳分半腹痛者加附子壹箇炮去皮臍泄利下重者先以水叁升薤白壹升半煮取貳升去滓以散方寸匕用薤白湯一盞煎八分日三四服

厥陰證

尺寸俱微者厥陰受病他六七日發以其脈循陰而絡於肝故煩滿而囊縮（微緩者囊必不縮若外證發熱惡寒似瘧爲欲愈候宜桂枝麻黃各半湯也若尺寸俱沉短者囊必縮宜承氣湯下之方在可下證中）厥陰之爲病消渴氣上衝心中痛熱飢而不欲食食則吐蚘下之利不止烏梅丸主之

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安者此藏厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘令病者靜而復煩也此藏寒蚘上入其鬲故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭卽出其人常自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之又治久痢（藏厥宜四逆輩極冷服之）

烏梅（壹百伍拾個）　乾薑（伍兩）　黃連（捌兩）　當歸（貳兩）
川椒　桂枝　附子　人參　黃蘗　細辛（各叁兩）

異擣篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之貳斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與蜜再杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑臭食物等

厥陰中風脈微浮者爲欲愈不浮爲未愈

脈遲。反以黃芩湯得徹其熱。腹中應冷。當不得食。今反能食。此爲除中。必死。

先厥後發熱。下利必自止。而反汗出咽痛者。其喉爲痺。發熱無汗。其利自止。若不止。必便膿血者。其喉不痺。

龐曰、熱少微厥。指頭寒。嘿嘿不欲食。煩躁數日。小便自如。此熱除也。宜乾薑甘草湯。（方在太陽證中。）

龐曰、手足逆冷。皆屬厥陰。不可下。亦不可汗。有須下證者。謂手足雖逆冷。或有温時。手足雖逆冷而手足掌心必煖。非正厥也。故可消息汗下也。

傷寒一二日至四五日厥者。必發熱。前發厥者。後必發熱。厥甚熱亦甚。厥微熱亦微。厥不過五日。六日不厥者。必愈。若六日厥者。必發熱愈甚。仍下利也。

龐曰、寒熱而厥。面色不澤。冒昧者。當用絲衣包手足。令温煖。必大汗而解也。有不因大汗下。而兩手忽無脈。謂之鬼伏。或一手無脈。謂之單伏。或利止。如此必有正汗。急用四逆輩温之。時有汗便安。脈終不出者死。下利先厥後發熱。利必自止。不爾。咽中痛。或喉痺。若便膿血者。其喉不痺。

厥而下利者。當不能食。反能食者。爲除中。必死。能食反發熱。脈數者。必發癰。膿厥而嘔。胸脇煩滿。後必便膿血。

病者手足冷。小腹按之痛。此結冷在膀胱關元也。（當關元灸之。）發熱下利。厥逆躁不得臥者死。

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂　赤小豆等分

細末別以香豉壹合熱湯壹盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加藥再服待吐快乃止諸亡血虛家不可與服有用丁香者吐之多霍燥人

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水漬入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓　桂各壹兩　生薑壹兩半　甘草半兩

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯有不因下而自利加劒血者永宜此方

麻黃壹兩　升麻　當歸各半兩　知母　黃芩

萎蕤各叁錢　芍藥　天門冬　桂枝　茯苓

甘草　石膏　白朮　乾薑各壹錢半

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一

服以汗出卽住服。

本自寒醫復吐下之寒格愈逆食入口卽吐宜乾薑黃芩湯。

乾薑　黃芩　黃連　人參（各壹兩半）

細剉。水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞。

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治。

凡厥通用四逆湯（方在四逆證中）謂其脈浮遲或微或細或沉皆屬裏有寒也。

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之。

知母　石膏（搥兩）　甘草（半兩）　粳米（叁合）

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩。

龐曰三陽皆有合病凡合病者有十四證唯三陰無合病。

兩感證

龐曰素問載兩感於寒其脈應與其病形者一日則巨陽與少陰俱病頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病腹滿身熱不欲食讝語三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入口不知人六日死言其六日死者是藏府榮衞或有所通行故四日少陰與太陽俱病五日與太陰與陽明俱病六日厥

陰與少陽俱病。是重傳得六日死矣。其有三日死者。素問謂陽明爲五藏十二經脈之長。其邪氣盛。故不知人。三日其氣乃絕。故死矣。夫邪氣盛則實。表裏邪實。併領血氣。入胃不通於榮衞氣血。故氣血隨邪而盡。則三日死矣。其脈候素問已脫。今詳之。凡沉者皆屬陰也。一日脈當沉而大沉者。少陰也。大者太陽也。二日脈當沉而長。三日脈當沉而弦。乃以合表裏之脈也。沉長沉弦。皆隱於沉大。凡陰不當合病。唯三陽可以合病。今三陰與三陽合病。故其脈似沉緊而大。似沉實而長。亦類革至之死脈也。

三陰三陽傳病證

龐曰、傷寒一日巨陽受病。前所說膀胱詳矣。病源云。小腸雖則誤其標。本其手足陰陽。自有併病者。故素問云、六日三陰三陽五藏六府皆受病。榮衞不行。五藏不通。則死矣。是表裏次第傳。不必兩感。亦有至六日傳徧五藏六府而死者也。素問云、諸浮不躁者。皆在陽則爲熱。其有躁者在手。假令第一日脈不躁。是足太陽膀胱脈先病。脈加躁者。又兼手太陽小腸也。又云、諸細而沉者。皆在陰。則爲骨痛。其有靜者在足。假令第四日脈靜者。足太陰始傳病也。脈加數又兼手太陰病也。故六日亦能傳徧藏府也。躁謂脈數。靜謂脈不數。用藥則同。若用鍼須取足與手之經也。

傷寒總病論卷二

可發汗證　不可發汗證
四逆證　和表證
可下證 血證附　不可下證
可水不可水證　可吐不可吐證
可灸不可灸證　可火不可火證
可温證　火邪證

可發汗證

大法春宜發汗

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者自發熱陰弱者自汗出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

桂枝　芍藥　生薑 各壹兩半　甘草 壹兩　大棗 陸個

咬咀水叁升半微火煎取壹升七合半生布絞去滓温服一盞須臾啜熱粥一椀令助藥力周覆一

時汗偏身濈濈者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差止後服不必盡劑也若不汗如前法更服半日許令三服若病重者一日一夜可盡一劑病證猶存者更作服若汗未出乃至二三劑忌生冷黏滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈按風池是少陽之經陽維之會不針天柱而取風池者陽維維諸陽巨陽與諸陽主氣故也

麗曰凡桂枝湯證病者常自汗出小便不數手足温和或手足指梢露之則微冷覆之則温渾身熱微煩而又增寒始可行之若病者身無汗小便數或手足逆冷不惡寒反惡熱或飲酒後愼不可行桂枝湯也脈緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之桂枝湯內加附子壹枚炮去皮尖切片同煎如前小便難爲有津液可作汗若小便數不可誤認陽旦證也陽旦卽桂枝湯異名也

下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之桂枝湯內去芍藥只用四味也芍藥味酸脈促胸滿恐成結胸故去芍藥之佐全用辛甘發散其肉氣也

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加白朮茯苓各一兩半主之不用桂加水成四升取二升

太陽病項背強几几汗出惡風者桂枝加葛根貳兩添水成四升煎取貳升通治柔痓

太陽下之微喘者表未解也桂枝加杏人厚朴湯主之（桂枝內加厚朴壹兩杏人肆拾枚）此則中風自汗用桂枝湯證也
龐曰惡寒者不當風而憎寒惡風者當風而憎寒皆屬表證太陽病頭痛發熱身疼痛骨節煩疼惡風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃（壹兩半）桂枝（壹兩）甘草（半兩）杏人（叁拾伍個）

咬咀水貳升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮取壹升貳合半去滓每飲一盞續次服盡不用粥投溫覆如桂枝法將息未汗可再作二三劑

龐曰傷寒之脈緊盛而按之澀是也脈浮而緊浮爲風緊爲寒風傷衞寒傷榮榮衞俱病骨節煩疼外證必發熱無汗或喘其人但憎寒手足指末必微厥久而復溫掌心不厥此傷寒無汗用麻黃證

凡脈浮數或浮緊無汗小便不數病雖十餘日尙宜麻黃湯也

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱自汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也大青龍湯

麻黃（叁兩）桂枝　甘草　石膏（各壹兩）
杏人（貳拾個）　棗（伍枚）　生薑（壹兩半）

咬咀水五升煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮取二升每溫飲一盞微汗爲度若汗周身潤則止服未

周身潤可停待少時服盡不欲汗多亡陽故也亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯主之（少陰當言太陰按太陰證內有脈浮緩手足溫者繫太陰太陰當發證屬青龍湯似桂枝證反無汗而脈緊似麻黃證反身不疼而脈浮緩）

太陽病項背八八無汗惡風葛根湯主之

葛根（貳兩）　麻黃（壹兩半）　桂枝（壹兩）　甘草（壹兩）

芍藥（壹兩）　大棗（陸枚）　生薑（壹兩半）

咬咀水四升先煮麻黃葛根數沸去沫下諸藥煮取貳升半去滓每溫飲一盞日三服如桂枝湯將息

太陽與陽明合病必自下利者葛根湯主之

太陽與陽明合病不利但嘔者葛根加半夏湯主之用前葛根湯內加半夏壹兩壹分湯洗十徧（每個作四破）

麗曰脈浮緊無汗服湯未中病其人發煩目瞑極者必衄小衄而脈尚浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可再行也凡脈浮自汗服湯不中病桂枝證尚在必頭痛甚而致衄小衄而脈尚浮者再與桂枝湯衄後脈已微者不可再行也

傷寒三日後。與諸湯不差。脈勢如數。陽氣猶在經絡。未入藏府。宜桂枝石膏湯。此方可夏至後代桂枝證用之。若加麻黃壹兩。可代麻黃青龍湯用之。

石膏 叁兩　梔子 貳拾肆個　生薑 壹兩半　桂枝 壹兩　黃芩 各壹兩　甘草 各壹兩　升麻 各壹兩　葛根 各壹兩半

�once咀。水五升。煮取貳升半。去滓。溫飲一盞。食頃再服。若得汗。卽止後服。

麕曰。凡發汗以辛甘爲主。復用此苦藥者何也。然辛甘者。折陰氣而助陽氣也。今熱盛於表。故加苦以發之。素問云。熱淫于內。以苦發之故也。

葛根龍膽湯。療病四五日不差。身體毒熱面赤。兼治陽毒風溫。

葛根 生者肆兩。乾者貳兩代。　生薑 升麻 大青 龍膽 桂枝　甘草 麻黃 芍藥 各半兩　萎蕤 壹兩半　石膏 壹兩半。凡葛根須用家園味甘多白粉者爲佳。

�once咀。水四升半。下麻黃煮數沸。去上沫。內諸藥。煎貳升。去滓。溫飲一湯盞。日三夜二。若誤用味苦野葛多吐。人轉增病。

時行熱病。六七日未得汗。脈洪大或數。面目赤。身體大熱煩躁。狂語欲走。大渴甚。又五六日以上不解熱在胃中。口禁不能言。爲壞傷寒醫所不能治。如死人。或精魂已竭。心下纔煖。發開其口。嚥藥下咽卽活。兼

治陽毒麥奴丸。

麻黃（去節）　釜底煤　黃芩　龍腦墨　梁上塵

小麥奴　竈中黃土（各壹分）　芒消　大黃（各半兩）

細末蜜丸彈子大。新汲水三合。和一丸研服之。渴者但令冷水足意飲之。須臾當寒竟。汗出便差。若日移五尺不汗。依前法再服一丸。差卽止。須微利。小麥奴乃小麥未熟時叢中黑麥捻之成黑勃者是也。無卽以小麥炒黑焦地上出火毒用之亦得。此藥須是病人大渴。倍常躁盛。若小渴者強與之爲禍耳。強人每服半雞子大。（亦治溫瘧）

傷寒連服發汗湯七八劑。汗不出者死。如中風法蒸之。使溫熱之氣外迎。無不得汗也。古今用效薪火燒地。良久去火掃地。以水洒之。取鹽沙、桃柏、荊葉、糠及麥麩皆可。同和鋪燒地上。可側手厚。上鋪席。令病人臥席上。溫覆之。熱月只可夾被覆。其汗立出。後周身至脚心皆汗濈濈。乃用溫粉撲止。移之上牀。卽愈。無鹽沙。卽用麩糠之類鋪燒地上亦得。（溫粉法。白朮、藁本、白芷各兩貳。末之。入英粉拾貳兩。和勻用之。無英粉以蜂粉代之。）

傷寒差後。有不了了證者。謂至十日或半月二十日。終不惺惺。常昏沉以失精神。言語錯謬。或無寒熱。有似鬼祟。或朝夕潮熱。頰赤。或有寒熱如瘧狀。此乃發汗不盡。餘毒氣在心胞絡間所致也。宜知母麻黃湯。

知母（壹兩半）　麻黃（壹兩）　芍藥　黃芩

甘草　桂枝各半兩。

咬咀。水貳升半。煮麻黃數沸。去上沫。內諸藥。取壹升叁合。去滓。每溫飲一大盞。半日可相次三服。溫覆令微汗。若心煩欲水。當梢與之。令胃中和則愈。未汗盡劑。

太陽病下之後。氣上衝。其脈必浮。可依證發汗。不與汗則成結胸也。凡發汗脈浮大。雖大便祕小便少者。可發汗而解也。合汗不汗。諸毛孔閉塞。悶絕而死。

不可發汗證

脈浮緊。法當身痛。當以汗解。假令尺中脈遲。爲榮氣不足。血少故也。前陽明病脈遲汗出。多微惡寒。宜桂枝湯。不實榮不足。蓋尺脈長大而遲也。此若軟緊而遲。不可汗。宜小建中湯。

小建中湯

桂枝叁分　生薑叁分　芍藥壹兩半　甘草半兩　棗陸枚　飴糖兩合半。

咬咀。水貳升半。煮取九合。去滓。方下飴糖。煎令化。每溫飲一湯盞。日進二三服。尺尙遲。再作一劑。入人參加半兩同煎最良。舊有微渣或嘔者。不用飴糖也。兼治傷寒一二日胸中悸而煩。及汗後身疼。脈沉遲。又治傷寒陽脈澀。陰脈弦。法當腹中急痛。先小建中湯不差。與柴胡湯。方在和表證中。

龐曰、凡脈緊。病必無汗。唯濡而緊。病必自汗。勿誤行桂枝。宜建中湯也。

脈濡弱不可發汗。汗則厥而煩躁。不得眠。

諸動氣在心腹上下左右。不可發汗。

龐曰、諸脈動數微弱。不可發汗。（以上並宜建中湯。若煩躁者宜竹葉湯。）

竹葉湯治虛煩。病似傷寒。身亦熱而煩躁。頭不痛。身不疼。脈不數者。兼治中暍。渴吐逆而脈滑數者。及傷寒解後。虛羸少氣逆欲吐者。並宜服之。

淡竹葉（半把）　石膏（肆兩）　半夏（叁分）　人參（半兩）

甘草（半兩）　麥門冬（貳兩）　粳米（壹合。淘過。）

細剉。以水伍升。煎貳升半。米熟去滓。溫飲一盞。日進三服。夜二服。嘔者加生薑一兩半。不嘔不用。

虛煩或嘔吐。脈弦細芤遲。手足微寒。胸滿者。橘皮湯主之。兼治暴煩下利。（方在太陰證中。）

四逆不可發汗。發汗則聲嘶舌萎。不得前言。亂睛眩者。命將難全。

咽中閉塞。不可發汗。發汗則吐血。氣微絕。手足不能自溫者。乾薑甘草湯主之。（方在太陰證中。）

淋家不可發汗。發汗必便血。

瘡家雖身痛。不可發汗。汗出則痙。（以雖瘡家機血過多。）

動氣在右。不可發汗。汗出則劇而渴。心苦煩。飲則吐水。動者。謂心腹中虛氣動。若誤汗有此證。先宜五苓散三服。方在可水證中。次服竹葉湯。方在前。動氣在左。不可發汗。發汗則頭眩。汗出則筋惕肉瞤。此爲逆難治。但先服防風白朮散。次服建中湯。方在前。防風白朮散。

防風 壹兩 牡蠣粉 半兩 白朮 叁分

細末。溫米飲調下二錢。日二三服。汗出續與建中湯。

動氣在上。不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。李根湯主之。

半夏 半兩 桂枝 當歸 芍藥 黃芩

甘草 人參 各壹分 茯苓 叁分

麤末。每五錢。水兩盞。薑三片。甘李根白皮一圍。如雞子黃大。煎八分。通口日三五服。

動氣在下。不可發汗。發汗則心中大煩。骨節苦痛。目運惡寒。食則反叶。穀不得前。先服大橘皮湯。得吐止。後服建中湯。

大橘皮湯 亦主手足冷嘔噦。

橘皮 壹兩半 生薑 貳兩 棗 貳拾肆箇 甘草 半兩

人參 壹分 竹茹 半兩

咬咀。水叁勝。煎壹升半。去滓。溫服一盞。食頃再服。

不當汗而強汗之。則津液枯槁而死。

四逆證

四逆湯治病發熱頭痛。脈反沉。若不差。身體疼痛者。脈浮遲。表熱裏寒。下利清穀者。汗出熱不去。內拘急。支節疼。四逆者下利厥逆。惡寒者下利腹脹滿。身疼脈浮者先用四逆溫裏。得利止。乃可隨證用藥攻表也。

甘草（壹兩）　附子（半個）　乾薑（叁分）

咬咀。以水壹升半。煮取陸合。去滓。溫分作貳服。

手足厥。脈微欲絕者。當歸四逆湯主之。

當歸　桂枝　芍藥　細辛（各壹兩半）

棗（叁拾陸個）　甘草　木通（各壹兩）

咬咀。以水四升半。煮二升二合。去滓。每溫一盞服。

和表證

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴或利。或噎或小便難。腹滿而喘者。小青龍湯主之。

麻黃　芍藥　細辛　乾薑　甘草

桂枝各壹兩半去皮 半夏叁分 五倍子半兩

咬咀。以水六升。先煮麻黃數沸。去上沫。內諸藥。煮一升。去滓。每溫服一盞。若渴者。去半夏。加括樓根壹兩半。若微利。去麻黃。加薤花一雞子大。炒赤。若嘔者。去麻黃。加附子壹枚。炮。小便不利。小腹滿者。去麻黃。加赤茯苓貳兩。若喘。去麻黃。加杏仁壹兩壹分。無薤花。以桃花壹鴨子大。不炒代之。

太陽病得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脈微緩者。爲欲愈也。脈微而惡寒。此陰陽俱虛。不可更發汗吐下也。面色反有熱色者。未解也。以其不能得小汗出。其身必痒。宜桂枝麻黃各半湯。

桂枝湯末　麻黃湯末各三分

以水一升半。煮三箇生薑三片。煎減半。去滓。溫飲一盞。未有小汗。再服之。

服桂枝湯。大汗出。脈洪。證候不改者。服桂枝湯如前法。若形似瘧狀。日再發者。宜桂枝二麻黃一湯。

桂枝湯末壹兩　麻黃湯末半兩

以水一升半。薑三片。棗三箇。煎減半。去滓。溫飲一盞。未有小汗。再服之。

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴。脈洪大者。白虎湯加人參主之。方在厥陰證中。

龐曰、傷寒已得汗。身和。脈絃細。讝語妄見。此爲津液不和。與小柴胡去仁參。加桂枝湯服之。津液和自愈。

未差。與調胃承氣湯下之。

傷寒六七日。發熱微惡寒。支節煩疼。微嘔。心下支結。外證未去。柴胡桂枝湯主之。兼治寒疝腹痛。

柴胡（壹兩）　桂枝　黃芩　人參（各半兩）　半夏（四錢半字）　芍藥（半兩）　甘草（一錢一字）　大棗（九枚）　生薑（半兩）

㕮咀。以水三升半。煮取一升七合半。去滓。溫飲一盞。

小柴胡湯治傷寒五六日中風。往來寒熱。胸脇滿。嘿嘿不欲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞕。或心下悸。小便不利。或不渴。身微熱。或欬者。

柴胡（貳兩）　甘草　黃芩　人參（各三分）　半夏（陸錢半字）　生薑（三分）　大棗（叁枚）

㕮咀。以水六升。煮取三升。去滓。再煎取一升半。溫作三服。若胸中煩而不嘔者。去半夏、人參。加括樓半箇。若渴。去半夏。加人參成貳兩。貳錢半。括樓根貳兩。若腹中痛。去黃芩。加芍藥壹兩半。若脇下痞鞕。去大棗。加牡蠣貳兩。若心下悸。小便不利。去黃芩。加茯苓貳兩。若不渴。外有微熱。去人參。加桂枝壹兩半。溫覆微汗愈。若欬。去人參、大棗、生薑。加五味子壹兩。壹分。乾薑壹兩。

傷寒中風。有柴胡證。但見一證。不必悉具。凡以柴胡證而下之。與柴胡湯。必烝烝而振。却復發熱汗出而

解也

病十日以上。脈浮細嗜臥者。爲已安候。小柴胡和之。細而遲者勿與。

婦人中風七八日。續自寒熱發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。

婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則讝語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣。必自愈。（先宜小柴胡湯。不愈。可刺期門。）

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脈遲。身涼胸脇下滿。如結胸狀。讝語。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實取之。

陽明病潮熱。大便溏。小便自如。胸脇滿不去者。小柴胡湯主之。又不大便而嘔。舌上白苔者。亦宜服之。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然汗出而解。

陽明中風。脈浮弦大而短。氣腹滿。脇下及心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。若不尿。腹滿加噦者不治。

可下證 血證附

大法秋宜下。

陽明病發熱。不惡寒汗多者。急下之。

凡脈沉細數。爲熱在裏。又兼腹滿咽乾。或口躁舌乾而渴者。或六七日不大便。小便自如。或目中瞳子不明。無外證者。或汗後脈沉實者。或下利三部脈皆平。心下堅者。或連發汗已不惡寒者。或已經下。其脈浮沉按之有力者。宜大承氣湯。

大黃（半兩）　厚朴（壹兩）　枳實（壹枚）　朴消（半兩）

㕮咀。以水四升。先煮厚朴枳實至叁升。下大黃煮取壹升半。去滓。下朴消烊化。每温一盞服。利卽止後服。如作煮散煎。每服厚朴枳實末共叁錢。水兩盞煎壹盞半。下大黃末壹錢。煎壹盞。絞去滓。下朴消末壹錢。烊化服之。

陽明與少陽合病而利。脈不負者爲順也。負者失也。互相克爲負也。脈滑而數者有宿食。當下之。（宜大承氣湯。陽明土。其脈大。少陽木。其脈弦。若合病。土被木賊克。更利爲胃已困。若脈不弦。爲土不負。弦者爲土負。必死。）

脈雙弦而遲。心下堅。或脈大而緊者。陽中有陰。可下之。病者煩熱。汗出如瘧狀。日晡則發潮熱者。屬陽明。其脈必實。當下之而愈。

病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎。宜下之。

傷寒若吐。下後不解。不大便五六日以上至十餘日。日晡則發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則

不識人。循衣妄撮。（常見有此撮空候。故改之。）惕而不安。微喘直視。脈弦者生。脈濇者死。微者但發熱讝語。可下之。一服利止後服。

過經讝語者可下之。

病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時。此有燥屎。故不大便。可下之。（以上皆宜大承氣湯。）

太陽病未解。其脈陰陽俱停者。必先振慄汗出而解。

陽微者先汗之所解。陰實者先下之而解。下之宜大柴胡湯。

柴胡（肆兩）　芍藥（各壹兩半）　枳實（兩枚）

生薑（貳兩半）　半夏（壹兩壹分）　大棗（陸個）　大黃（壹兩）

㕮咀。以水六升。煮取叁升。去滓再煎。每溫一盞服。

因下之後。潮熱而微利者。此醫以丸藥下之。非其治也。而有表證仍胸滿而嘔者。先服小柴胡湯。後服大柴胡湯。（小柴胡湯在和表證中。）

傷寒發熱。汗出不解。心中痞鞕。嘔吐下利者。大柴胡湯主之。

傷寒十餘日。結熱在裏。往來寒熱者。宜大柴胡湯。

陽明病讝語。發潮熱。脈滑疾者。小承氣湯主之。

大黃貳兩　厚朴壹兩　枳實兩枚

咬咀。水貳升半。煎至八合。去滓。放温時飲一盞。以利爲度。凡大便祕悶。恐有表證者。但少少飲之。微下爲度。不可飲多。恐大泄利也。虛弱人可作煮散煎服。

太陽病若吐下發汗後。微煩。小便數。大便難者。與小承氣湯。利之則愈。此太陽陽明證也。

下利讝語者。有燥屎也。宜小承氣湯。初一服讝語止。若更衣者。停後服。不爾盡與之。更衣卽登厠也。非顏師古注漢書更衣之義。集驗方痔有更衣挺出。顏妨於更衣。更衣出清血。故以知之。

陽明病不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。方在太陽證中。

發汗後惡寒者。虛也。不惡寒但熱者。實也。當和其胃氣。宜調胃承氣湯。

傷寒十三日過經。讝語者。此有熱。當以湯下之。若小便利者。大便當鞕。反下利。而脈調和者。知腎以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。爲內實也。宜調胃承氣湯。

太陽病過經十餘日。心下温温欲吐。而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。此時極吐下者。與調胃承氣湯。不爾。可與之。但欲嘔。胸中痛。微溏者。此非柴胡證。以嘔故知極吐下也。屬調胃承氣湯。

傷寒吐後。腹脹滿者。屬調胃承氣湯。

茵蔯湯治陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。其身無汗。劑頸而還。小便不利。渴而飲

水者以瘀熱在裏身必發黃

茵蔯蒿 叁兩　大黃 壹兩半　梔子 貳拾個大者柒枚

咬咀水貳升半先煮茵蔯至貳升內二味煮取壹升貳合半去滓溫飲一盞日三服小便當利尿如皂角沫一宿腹滅黃從小便出

十棗湯治太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表和裏未和也

芫花　甘遂　大戟 等分異杵篩秤末合之入白再杵二三百下

先以水壹升煮肥棗拾枚擘碎煮取半升去棗用煎湯少半調末一錢匕羸人半錢再單飲棗湯送之平旦服若下少而病不除明旦加藥一錢半如前服之服之必利利後糜粥自養

欬而脇下痛此爲有飲宜十棗湯

調中湯治夏月及秋初忽有暴寒折於盛熱熱結四支則壯熱頭痛寒傷於胃下利或血或水或赤帶下壯熱且悶脈數宜下之久年腸風下之亦差

大黃 叁分　葛根　黃芩　芍藥　桔梗

茯苓　蕨本　白朮　甘草 各半兩

咬咀。水叁升。煎至貳升。下大黃。取壹升貳合。去滓。溫溫飲一盞。移時。勿飡食再服之。得快下。壯熱便歇。其下利亦止。凡秋夏早熱積日。或有暴寒折之。熱無可散。喜搏著肌中作壯熱氣也。胃爲六府之表。最易爲暴寒所折故也。虛人亦不在壯熱。但主利或霍亂。不宜用此。實人有服五石人。喜壯熱。與別藥下。則加熱喜悶而死矣。是以宜以此下和其胃氣。（謂中湯又治陽病。因下遂湯熱利不止。及傷寒不因成壹兩煎服之。殊驗也。）茵蔯丸。療瘴氣及黃病瘡瘧。

茵蔯　梔子　鼈甲　芒消（各壹兩。）　大黃（貳兩半。）

豉（貳合半。）　常山　杏仁（各壹兩半。）　巴豆（半兩。）

細末。蜜丸。梧桐子大。初得時氣三日內。平旦米飲服二丸。如人行十里久。或吐或利。或汗出。不爾。更服一丸。以熱粥投之。老少以意加減丸數服。若黃病疫癖。時氣傷食瘧瘧。小兒驚熱。欲發癇。服之無不差者。療瘴神驗。赤白痢服之亦效。春初有宿熱。依上法服之。取吐利。當年不憂熱病。（有性殺藥者。每服七丸五丸。）

抵黨湯。治太陽病六七日。表證在脈微而沉。反不結胸。其人發狂者。乃熱在下焦。小腹當鞕滿。小便反利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀血在裏故也。（小腹滿而小便不利者。非血證。）

水蛭　蝱蟲（各拾枚。）　桃仁（柒枚。）　大黃（壹兩。）

咬咀以水貳升半煮至壹升貳合半去滓溫溫分四服未下再服虛人只可作半料服之如作煮散每五錢水壹盞半煎壹盞去滓服之

桃人承氣湯治太陽病不解熱結在膀胱其人如狂血自下者乃愈其外不解者尚未可攻當先隨證行湯解外外已解但小腹急結者乃可攻之（不惡寒爲外解）

桃人（貳拾肆個）　大黃（貳兩）　甘草　桂枝　芒消（各壹兩）

咬咀以水叁升半煎取壹升半去滓內芒消烊化溫服壹盞虛人減作半料亦可作煮散每伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓下芒消壹錢半烊化服之

桃人承氣湯又治產後惡露不下喘脹欲死服之十差十

麗曰脈朝夕駛者實癖也可下之朝平夕駛者非癖也不可下駛謂數脈六七至者也若脈數一息八九至愼不可下若下之則煩躁下利不止而死凡數脈與皮毛相得亦不可下也合下不下令病人腹脹滿通身浮腫而死

不可下證

脈軟而弱弱反在關（關下三分也）濡反在顛（關上三分也）微反在上（寸口也）澁反在下（尺部也）微則陽不足澁則無血陽氣反微中風汗出而反煩躁澁則無血厥而且寒宜建中湯（方在不可汗證中）

陽微不可下下之則心下痞。

諸動氣在心腹上下左右俱不可下。

動氣在右不可下下之則津液內竭咽躁鼻乾頭眩心悸。宜竹葉湯方有不可汗證中。

動氣在左不可下下之則腹裏拘急不止動氣反劇身雖有熱反欲勃。先服乾薑甘草湯方在太陽證中。後服建中湯方在不可汗證中。

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身冷熱汗自泄欲水自灌竹葉湯主之。方在不可汗證中。

動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅半夏瀉心湯主之。方在痞證中。

咽中閉塞不可下。

麁曰諸脈濡弱微虛細相搏俱不可下。

諸四逆不可下虛家亦然。

麁曰若下證悉具而見四逆者是失下後氣血不通使然但手足微厥掌心常温時復指稍温便下之不可拘忌也。

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也。

麁曰凡下證小便不利或尚少未可攻之也。

不當下而強下之令病人腸胃洞泄不禁而死。

可水不可水證

龐曰、凡病非大渴不可與冷水。若小渴口咽乾。小小呷滋潤之。若大渴煩躁甚。能飲一斗者與五升。能飲一升者與半升。若乃不與則乾燥無由作汗。煩喘而死者多矣。但勿令足意飲也。若大汗將來。躁渴甚者。但足意飲之勿疑。常人見因渴飲水而得汗。見小渴遂強與之。致停飲心下。滿結喘而死者亦多矣。其有熱脈數。尚可作汗而解者。出於天幸也。

五苓散治病人水藥入口則吐。或渴而嘔者。或汗後脈尚浮而煩渴者。或下利渴而小便不利者。或因渴停水心下。短息者難治。嘔而小便不利者。皆主之。

豬苓　白朮　茯苓　桂枝　澤瀉各半兩。

細末。白飲調下貳錢。日叁服。數飲煖水。汗出效。

陽明病小便數者。大便卽堅。不更衣十日無所苦。欲得水但與之。當以法救渴者。五苓散主之。

霍亂頭痛發熱。身體疼。發熱欲飲水。五苓散主之。若得病無熱。但狂言煩躁不安。精采不與人相當。勿以火導之。但以豬苓散方寸匕服之。當逼飲新汲井水壹升。卽令指刺喉中吐去之。病隨手愈。若不能吐者。勿強與水。水停則結心下也。當以藥吐之。不爾。更致危病。若當吐不時。以豬苓散吐之。其死迫速矣。亦可針之尤佳。夫飲鬲實難治。此皆三死一生也。太陽病發汗後。大汗出胃中乾燥。煩不得眠。其人欲飲水者。

但與之當稍稍飲之令胃和則愈

可吐不可吐證

龐曰、胸鬲痞悶痰壅寒礙脈得浮或滑並宜瓜蒂散吐之（方在厥陰證中）產後六七日內下瀉諸藥不効得此脈與吐之瀉立止

下利日數十行其脈反遲寸口微滑吐之則止

龐曰虛家當吐而不敢吐之宜以枳實散壓氣毒痰水過日毒入胃乃可微下之也（橘皮湯在和表證中枳實散在厥論中）

諸四逆脈微弱虛細或弦遲雖中滿悶不可吐宜橘皮湯枳實散之類

不可吐而強吐之氣築心即死矣

可灸不可灸證

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發賁豚氣從少腹上撞者灸其核上一壯與桂枝加桂湯（桂枝湯內加桂枝足成壹兩壹分如前法煎之）

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死灸少陰七壯

下利手足厥無脈灸之不煖反微喘者死

傷寒脈促手足厥逆可灸之

合灸不灸。令病人冷結。久而彌固。氣衝心而死。微數之脈。愼不可灸。因火爲邪。則爲煩逆。追虛逐實。血散脈中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。

脈浮當以汗解。而反灸之。邪無從去。因火而盛。病從腰以下必當重而痺。此爲火逆。若欲自解。當先煩。煩乃有汗。隨汗而解。何以知之。脈浮故以知汗出而解。脈浮熱甚而灸之。此爲實實以虛治。因火而動。咽躁必唾血。

不當灸而誤灸。令火邪入腹。干錯五藏。重加煩而死。

可火不可火證

下利穀道中痛。當以熬鹽末熨之。或炒枳實末溫熨二味相兼益佳。若臍下冷結。不可便熨。冷氣攻心腹必死。須先用藥溫之。久而可熨。凡臍下冷結成關陰。大小便不通。服藥雖多不見效。以炒鹽熨臍下。須臾卽通。然關陰已服巴豆甘遂、大黃輕粉之類太多。卽暴通利而損人。尤宜詳之也。

可溫證

大法冬宜溫熱藥。

少陰病、其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脈弦遲。若鬲上有寒飲乾嘔者。不可吐。宜四逆湯溫之。方在四逆湯中。

下利其脈浮大。此爲虛。以強下之故也。設脈浮大。因爾腹鳴。宜當歸四逆湯溫之。方在四逆證中。

火邪證　醫以火臥床下。或週身用火迫却汗。或熨或艾灸。皆屬火邪也。

傷寒脈浮。醫以火迫却之。亡陽驚或狂起。臥不安者。宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯。

桂枝　壹兩半　蜀漆　壹兩半　甘草　壹兩　龍骨　貳兩

牡蠣　貳兩半　生薑　壹兩半　大棗　陸枚

以水陸升。先煮蜀漆。減壹升。內諸藥。煮取貳升。去滓。溫服壹盞。無蜀漆。以恆山代之。火却後脈浮。當汗出而愈。

火邪下之。因燒針煩躁者。桂枝甘草湯主之。

桂枝　半兩　甘草　牡蠣　龍骨　各壹兩

以水二升。煮一升。去滓。溫取一盞。可代救逆湯使之。

龐曰、灸及燒針後。證似火却者。並宜火却治之。煩躁驚及狂。用六石風引湯尤良。柴胡加龍骨牡蠣湯亦通用。

病人因火却至十五六日。身黃下利。狂欲走。師脈之言當下清血如豚肝乃愈。後如師言。何以知之。師曰。寸口脈陽浮而陰濡弱。陽浮爲風。濡弱爲虛。浮虛受風少血。發熱惡寒。洒淅項強頭眩。醫以火熏鬱令汗

出惡寒遂甚客熱因火而發怫鬱烝於肌膚自爲黃小便微難短氣鼻中出血而復下之胃無津液利遂不止熱瘀在膀胱畜結成積狀如豚肝當下不下心亂迷憒狂走赴水必不能自制蓄血若去目明心了此皆醫所爲輕者得愈極者不治

傷寒總病論卷三

結胸證　心下痞證
陽毒證　陰毒證
狐惑證　百合證
痓濕暍證　痓候　濕候　暍候
發汗吐下後雜病證
傷寒勞復證　陰陽易證

結胸證

病發於陽而反下之熱入內作結胸其病心下堅滿按之如石鞕而痛項強如柔痓狀其脈寸口浮關上尺中皆沉或沉緊名曰結胸也下之則和宜大陷胸湯（今作煮散煎之）

大黃（壹兩半）　芒消（壹兩捌錢半）　甘遂（末壹字）

異末先以水壹升半煎大黃半升絞去大黃滓下消末更煮一二沸內甘遂末和勻溫分二服一服快利止後服如作煮散卽先以水一盞煎大黃末肆錢匕至捌分下消末貳錢匕候化勻下甘遂末

半錢匕。沸勻。温服之。移時未利。再煎一服。快利爲度。

藏結如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸口脈浮。關上脈小細沉緊。名曰藏結。舌上白苔生者難治。藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上苔滑不可攻也。

結胸證。其脈尺寸浮大者不可下。下之則死。（復宜發汗也。）

結胸證悉具。煩躁甚者死。

太陽病、脈浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出而反惡寒。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客熱動膈。短氣煩躁。心下懊憹。陽氣內陷。心下因鞕。則爲結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。

結胸無大熱者。此爲水結在胸脅也。但頭微汗出者。宜大陷胸湯。

太陽病、重發汗而復下之。不大便五六日。舌躁而渴。日晡則少有潮熱。從心下至小腹。滿而痛不可近者。宜大陷胸湯。

虛弱家不耐大陷胸湯。卽以大陷胸丸下之。

結胸者項亦強。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸丸。

大黃（肆兩）　葶藶子（壹兩半）　朴消（壹兩捌錢）　杏仁（貳合）

杵二味。內杏仁、朴消。合研如脂。丸如彈子大。抄甘遂末壹錢。白蜜貳合。水貳升。煮取壹升。溫頓服之。一宿乃下。不下更服。

小結胸正在心下。按之則痛。脈浮滑者。宜小陷胸湯。

半夏（陸錢半） 黃連（一分） 栝樓（壹枚。用四錢）

㕮咀。水叁升。煮栝樓至貳升。下諸藥。煮取壹升。去滓。溫服一盞。食頃再服。一日盡劑。微解下黃涎即愈。

太陽病下之。脈促者不結胸。此爲欲解也。脈浮者必結胸。脈緊者必咽痛。脈弦者必兩脅拘急。脈細數者頭痛未止。脈沉緊者必欲嘔。脈沉滑者協熱而利。脈浮滑者必下血。

寒實結胸無熱證者。與三物白散方。（小陷胸者非也。）

桔梗（叁分） 巴豆（壹分） 貝母（叁分）

細末。內巴豆研勻。白飲調下壹錢匕。人減之。病在高上必吐。在高下必利。未利啜熱粥投之。利過不止。飲冷粥止之。

龐曰、近世治結胸多行針頭丸。用硫黃陽起石者。若病熱毒甚者必死。唯治冷結寒實耳。

心下痞證

病發於陰而反下之爲痞。發熱惡寒爲陽。誤下則爲結胸。無熱惡寒爲發於陰。誤下則爲痞氣。傷寒下之後。若發熱汗出者爲欲解。若心下滿而鞕痛者。此爲結胸也。但滿而不痛。此爲痞氣。宜半夏瀉心湯。

甘草　黃芩　乾薑　人參　各壹兩半　黃連　半兩　大棗　陸枚　半夏　壹兩壹分

咬咀。水陸升煑取叁升。去滓。再煎壹升半。溫溫飲一盞。日三夜二。設下後津液入裏。胃虛上逆。寒結在心下。故宜辛甘發散。半夏下氣。苦能去濕。兼通心氣。甘草力大故乾薑黃連不能相惡也。

心下痞。按之濡。其脈關上浮者。宜大黃黃連瀉心湯。

大黃　壹兩　黃連　黃芩　各半兩

咬咀。以鰕眼沸湯壹升漬之。須臾絞去滓。溫溫分四服。得利止後服。寒濕迫心氣不行。卽作熱也。

心下痞悶而復惡寒汗出者。大黃黃連瀉心湯內加附子主之。附子。壹枚。炮。去皮尖。四破。以水叁合煎壹合。去附子。以附子汁內湯中。和勻服之。

與瀉心湯而痞不解。其人渴而口乾燥。小便不利者。五苓散主之。方在可水中。

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞕。乾噫食臭。脅下有水氣。腹中雷鳴下利。宜生薑瀉心湯。

生薑　貳兩　人參　甘草　黃芩　各壹兩半　半夏　壹兩壹分　大棗　陸枚　黃連　乾薑　各半兩

吆咀水伍升煮取叁升去滓再煎取壹升半温作四服胃中不和爲少陽木氣所制故用二薑之辛味

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之

甘草貳兩　黃芩壹兩　乾薑壹兩　人參各半兩

半夏各半兩　大棗陸枚　黃連半兩

吆咀水伍升煎至叁升去滓再煎取壹升半温作四服胃虛故加甘味

大下後復發汗心下痞惡寒者表未解不可攻痞當先解表表解乃可攻痞攻痞宜大黃黃連瀉心湯前加附子是汗出多而惡寒表將解而裏結未除故也此證是發後無汗惡寒故先須解表也

傷寒發熱汗出不解心下痞鞕吐嘔下利者大柴胡湯主之汗出嘔吐下利是胃中津液燥裏有結實非胃虛也故以大柴胡湯下之

病人脅下素有痞連臍傍引小腹入陰筋者此爲藏結死

陽毒證

初得病一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒其病腰背痛煩悶不安狂言欲走或見鬼或下利其脈浮大而數面赤班班如錦紋咽喉痛吐下膿血五日可治七日不可治升麻湯主之不可作發散

升麻　當歸　甘草各貳分　雄黃研壹分

桂枝壹分　鼈甲半兩　蜀椒半分

咬咀。水貳升煎壹升。去滓。溫服一盞。食頃再服。溫覆手足出汗。汗出則解。未解重作之。得吐尤佳。陽毒宜葛根龍膽湯。方在雜發汗證中。

陰毒證

初得病一二日便成陰毒。或服藥六七日以上至十日。變成陰毒。其病身重背強。腹中絞痛。咽喉不利。毒氣攻心。心堅強氣不得息。嘔逆唇青面黑。四支厥冷。其脈沉細而緊。仲景云。陰毒之候如被杖。喉咽痛。五六日可治。七日不可治。甘草湯主之。不可作煮散。

甘草　鼈甲　升麻　當歸　桂枝各貳分　蜀椒壹分　雄黃壹分

咬咀。水叁升煎取壹升。去滓。溫溫每飲一盞。食頃再服。溫覆。中毒當汗吐之。汗吐則愈。不吐再服之。

治陰毒反陰丹

硫黃伍兩研末　太陰玄精石味酸者研末　硝石研末各貳兩

用鐵銚子先鋪玄精石一半。次鋪硝石一半。中間下硫黃。又以硝石蓋硫黃。都以玄精石蓋之。用盞子合定。令三斤炭火燒。令得所。勿以煙出多。急取出以瓦盆合定。地下四面灰擁。勿令煙出。直候冷

取細研。烝餅心。丸豌豆大。艾湯下十五丸。病重加至二三十丸。此法甚驗。喘促吐逆者。入口便安。服此藥三五服。覺不退。便於臍下一寸半灸之。須是大炷百壯。未愈可至二百壯。若手足極冷。小便澀。小腹鞕。疼痛囊縮。卽須更於臍下四寸。如前灸之。乃與當歸四逆幷反陰丹。頻頻與服。內外通逐方可解。若稍緩卽死矣。當歸四逆乃加吳茱萸生薑者。是愼勿與尋常利小便藥。此是陰毒氣結在小腹所致也。有見小便不通。便用炒鹽及裹熱藥熨臍下。欲望小便通利。其冷氣在小腹之間。被熱物所熨。無處通出。卽奔上衝心。其死速矣。

又治陰毒硫黃丸

硫黃（貳兩）　水銀（壹兩）

同研入銚。洒少醋。慢火炒。欲似煙出。再出火洒醋。如此三四徧。地上放冷研之。烝餅丸梧桐子大。每服二十三十丸。艾湯吞下。日三服。食前。

陰毒脈沉微。欲絕。四支逆冷。大躁而渴不止。附子飲子。

附子（壹枚。半兩以上者。炮。去皮尖。四破。）

以水九升。煎至三升。去附子。入瓶。油單緊封。沉井底。候極冷取飲之。仍下硫黃丸甚妙。

陰毒之爲病。因汗下藥性冷所變多。在四五日也。或素來陽氣虛冷。始得病便成陰毒。或始因傷風傷冷

物便成陰毒其病六日內可治過六日不可治

狐惑證

狐惑之爲狀如傷寒或因傷寒變成斯疾其候默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其面乍黑乍白上部則聲嗄甘草瀉心湯主之（方在傷寒論中）蝕於下部則咽乾蝕於肛門者燒雄黃薰之（雄黃壹味燒薰下部）病者脈數則熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鴆眼七八日則兩目四皆周皆黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之　赤小豆（壹升浸生芽曝乾）當歸（壹兩）

細末漿水調下二錢日三服

百合證

龐曰百合病者百脈一宗悉致其病意欲食復不能食常默默欲臥復不能臥欲出行復不能行或有美食時或惡聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則增劇吐利者如有神祟者身形如和其脈微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺頭不痛淅然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或二十日或一月微見者隨證治之

治汗後百合病百合知母湯

百合（拾枚）　知母（壹兩半）

百合先洗漬一宿當白沫出去其漬水別以清泉水壹升半煮百合取壹升去滓又別以泉水壹升煮知母取半升去滓同百合湯煎至壹升溫分三服

治下後百合病滑石代赭湯

百合拾枚　滑石壹兩半　代赭半兩

先以水漬百合一宿當白沫出則去其水更以泉水壹升半煮取一升去滓別以泉水一升煮滑石代赭取半升去滓合和重煎至一升分溫三四服

治吐後百合病百合雞子湯

百合拾枚　雞子黃貳枚

先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水一升煮取一升去滓下雞子黃攪勻分溫三服

治不經吐下發汗百合病形如初者百合地黃湯

百合拾枚　地黃汁半升

先以百合水漬一宿有白沫出去其水更以泉水一升半煮取一升去滓內地黃汁再煮取一升二合溫溫分三服中病勿更服

治百合病一月不解變成渴者百合湯洗之

百合一升（如煎洗先漬一宿當白沫出去其水）更以水一斗煎數沸洗周身愼風仍食白湯餅但勿與鹽豉也煮餅是切麪條湯煮水淘過熱湯漬食之

渴不差栝樓牡蠣散主之

栝樓（無黃脈者）　牡蠣粉（等分）

細末水調方寸匕日三服

治百合病變發熱百合滑石散

百合（壹兩）　滑石（叁兩）

細末清飲調方寸匕日三服當微利熱則除已利勿服之

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆見陰攻陽乃復下之此亦爲逆

痓濕暍證

傷寒所至太陽病痓濕暍此三種宜應別論以爲傷寒相似故此見之

痓

太陽病發熱無汗。反不惡寒。名曰剛痓。

太陽病微熱汗出。不惡寒。名曰柔痓。病源云。惡寒。

其證身熱足寒。頭強項急。惡寒時頭熱。面赤目脈赤。獨頭搖。卒口噤。背反張者。痓病。

太陽病發汗太過。因致痓。素問曰。太陽所至。爲寢汗痓。又云。肺熱移於腎。傳爲柔痓。始太陽中風。發熱而故迫肺金。金投子而避害。故移熱於腎水。水爲火迫則上升。復凌心位。水入火鄉而爲郡。若汗大多。因而熱寐。汗反爲冷濕之氣復著太陽經。故發痓也。

痓病臥不着席。小兒腰背去席二指。大人側掌爲難。

治痓病脈弦。直上下行。

仲景云。太陽病證其身躰八八然。脈反沉遲者。爲欲作痓。宜桂枝加栝樓湯。括樓不主中風。強項八八。其意治肺熱。令不能移於腎也。桂枝湯內當加栝樓四兩。痓病不宜大發汗及針灸。宜小汗之。

柔痓宜桂枝加葛根湯。桂枝湯內加葛根四兩。方在解表證中。

剛痓宜葛根麻黃湯。

剛柔痓加減葛根麻黃湯。

葛根　麻黃　生薑各壹兩。　防風　芍藥

白朮　人參　芎藭　黃芩　防己

桂枝　甘草各半兩　附子壹枚

㕮咀。水六升。先煮麻黃葛根數沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。飲服一盞。食頃再服。日四五夜二三。柔痙自汗者。去麻黃加葛根成壹兩半。

剛痙胸滿口噤。臥不着席。脚攣急。其人必齗齒。宜大承氣湯下之。方在可下門中。

濕證

太陽病關節疼痛而煩。脈沉緩。濕痺之候。其人小便不利。大便反快。只當利其小便。宜五苓散。方在水證中。

濕家之爲病。一身疼發熱。身如熏黃。仍治風濕。脈浮。身汗出惡風。宜黃耆湯。

黃耆貳兩半　防己貳兩　甘草壹兩　白朮

生薑各壹兩半　棗拾陸個

㕮咀。水四升煎至二升。去滓。溫飲一盞。食久再服。喘者加麻黃壹兩。胃中不和者加芍藥壹兩半。氣上衝者。加桂枝壹兩半。下有陳寒者。加細辛壹兩。服後當如蟲行皮中。從腰下如冰。厚坐被上。又以一被繞腰以下。令微汗出。

濕家其人但頭汗出。背強。欲得被覆向火。若下之早。則噦。胸滿。小便不利。舌上如胎者。此丹田有熱。胸上有寒。渴欲得水而不能飲。口燥故也。

濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止汗出已解身復痛何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈也若治風濕者發其汗但微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞細末瓜蒂含水嚏少許鼻中則愈

濕家身煩痛可與麻黃湯內加白朮貳兩（麻黃湯在可汗證中）

病者一身盡疼發熱日晡則劇者此名風濕此病因傷於汗出當風或久傷於冷所致也可與杏仁薏苡湯

麻黃壹兩半　杏仁肆拾伍枚　薏苡仁　甘草半兩

㕮咀以水二升先煮麻黃一二十沸去上沫內諸藥煮取一升去滓溫二三服

傷寒八九日風濕相搏身體煩痛不能轉側不嘔不渴脈浮虛而澁者宜桂枝附子湯此治大便自利小便不利者

桂枝貳兩　附子貳枚　生薑壹兩半　大棗貳拾枚　甘草壹兩

㕮咀以水三升煮取一升去滓分溫四服若大便堅小便自利者去桂枝加白朮貳兩煎如前法初

一二服身如痺半日許服之都盡其人如冒狀勿怪此乃朮附幷走皮膚逐水氣未得除故使之耳風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則極汗出短氣小便不利惡風不欲去被或有微腫者甘草附子湯主之

附子 貳兩　白朮 貳兩　桂枝 叁兩　甘草 貳兩

咬咀水三升煮取一升去滓分温三服身腫者加防己貳兩悸氣小便不利加茯苓壹兩半溢水成四升煎一升三合

暍證

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎湯加人參主之方在厥陰證中

太陽中暍者身熱疼重而脈微此夏月傷冷水水行皮中所致也瓜蒂湯主之

瓜蒂 貳拾柒枚

水半升煮取二合半去滓温服

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脈弦而細芤而遲小便已洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口前開板齒燥若發其汗則惡寒甚加温針則反熱甚下之則淋甚宜大小橘皮湯大橘皮湯在不可汗證中小橘皮湯主手足冷嘔噦

橘皮・貳兩　生薑・肆兩

咬咀。水三升。煮取一升半。去滓。作四服。稍熱呷之。

發汗吐下後雜病證

病人脈微而濇。此乃醫所病。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒。後乃發熱無休止時。夏月盛熱。欲着複衣。冬月盛寒。欲裸其體。所以然者。陽微則惡寒。陰弱則發熱。此醫發其汗。使陽氣微。又大下之。令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃氣虛冷。以陽氣內微。不能勝冷。故欲着複衣。十一月之時。陽氣在裏。胃中躁熱。以陰氣內弱。不能勝熱。故欲裸其身。又陰脈遲濇。故知亡血也。此皆可治。陽微惡寒四逆・陰弱發熱爲內熱病・宜苦酒艾之類・大下後復發汗。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利。必自愈。

發汗後其人臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝湯主之。

茯苓・肆兩　桂枝・貳兩　甘草・壹兩　大棗・捌個

咬咀。以甘爛水五升。先煮茯苓。減一升。內下諸藥。煮取一升半。溫溫作三服。

作甘爛水法

取水貳斗。置大盆中。以楊柏枝擊水上。有珠子五六千箇相逐。取用之。

發汗或下後痞滿。或成寒實結胸。氣塞不通。宜檳榔散。

檳榔貳個一生

細末酒二盞煎二盞四分作兩服温飲之兼治蚘厥心腹刺痛南海本草治膀胱氣佳

麤曰因發汗時汗出如水漏下還復汗少喘促不止脈促而按之濡者合當汗而解脈促而按之實者死若脈浮手足微厥面垢脣青甘憒而喘者陰陽未和尚阻升降宜服順陰陽五味子湯

麻黃半兩　人參五味子麥門冬各一分　棗柒枚

杏人　橘皮生薑各一分　棗柒枚

㕮咀水二升煮七合去滓通口服一盞未差再作二三服手足厥甚者厚衣護其厥下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者宜乾薑附子湯不可作煮散

乾薑壹兩　附子壹枚生

㕮咀水一升半煎至半升時飲一小盞食久再服

傷寒若吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振振搖者宜茯苓白朮湯

茯苓貳兩　桂枝壹兩半　白朮甘草各壹兩

㕮咀水三升煮至一升半去滓分温四服

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反復顛到心中懊憹香豉梔子湯主之少氣者加甘草嘔者加生薑

梔子香豉湯

肥梔子 貳拾枚　香豉 兩合綿裹

水二升煎梔子至一升三合下豉取七合半去滓每進一盞得吐止後服

梔子甘草湯前湯內加甘草壹兩同梔子煮後下豉如前法加水半升

梔子生薑湯前方內加生薑貳兩半同梔子煮後下豉同前法加水一升

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者欲解也屬梔子香豉湯主之用前方下後腹煩滿起臥不安者梔子厚朴湯主之

梔子 八個大者　厚朴 貳兩　枳實 二枚

咬咀水二升煮一升去滓溫飲一盞

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯主之

肥梔子 八個　乾薑 壹兩

以水一升七合煮取八合去滓分溫三服

凡用梔子湯得効即止後服病人舊有微溏不可與之

發汗若下之而煩熱胸中窒塞者梔子湯主之

傷寒五六日已發汗而復下之胸脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱煩者此表未解柴胡桂枝乾薑湯主之

桂枝　黃芩　各壹兩半　柴胡　肆兩　栝樓根　貳兩　乾薑　甘草　牡蠣　各壹兩

㕮咀水六升煎至三升去滓再煎一升半溫溫時飲一盞食頃再服

傷寒發汗若吐下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復花代赭湯主之

旋復花　甘草　各壹兩半　人參　壹兩　生薑　貳兩半　代赭　末半兩　棗　三枚　半夏　壹兩半

㕮咀水五升煎三升去滓再煎取一升半溫分四服

傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩飲水至數升者白虎加人參主之方在厥陰證中

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣湯主之

柴胡　貳兩　龍骨　黃芩　生薑　鉛丹　人參　桂枝　茯苓　牡蠣　各叁分　半夏　壹合

大黃 壹兩 棗 陸個

咬咀水六升煎取三升下大黃切如棊子塊更煎取貳升去滓温飲一盞

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中治中焦此利在下焦以赤石脂禹餘糧湯主之復不止當以五苓散利小便五苓散方在可水證中

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂 禹餘糧 各八兩

水四升煮取二升去滓温飲一盞

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之

桂枝 甘草 各貳兩 白朮 人參 乾薑 各壹兩半

咬咀水五升先煮四味取三升內桂更煮取一升去滓温分三服

發汗後腹脹滿者厚朴人參湯主之

厚朴 四兩 甘草 壹兩 生薑 四兩 半夏 壹兩壹分 人參 半兩

以水五升煮取一升半去滓温分三服

治頭痛壯熱心中煩黃芩梔子湯

黃芩（各壹兩半）　梔子（各壹兩半）　石膏　乾葛（各貳兩）　豉（半兩）　葱白（十寸切半斤）

咬咀。水四升煮取一升半。溫溫作三四服。始得病便如前證。亦可服。治夏月傷暑毒殊驗。

傷寒發汗後。或未發汗。頭痛如破。宜葱白湯。

連鬚葱白（十寸切半斤）　生薑（貳兩）

水二升煮一升去滓。溫溫作二三服。

服前湯頭痛未解。宜葛根葱白湯。

葛根（壹兩）　芍藥　芎藭　知母（各半兩）

葱白（壹握十寸切）　生薑（壹兩）

咬咀。水二升半煮取一升去滓。溫溫分減服。

傷寒頭痛立効荊芥散

天南星　草烏頭（為白者生用）　荊芥穗（各半兩）　石膏（壹兩）

細末。每服二錢半。陳茶一錢。薑汁半呷。薄荷三葉。水兩盞。煎至八分。溫溫相次三服。

傷寒嘔吐不止。惡寒脈細。或浮遲。宜理中丸。兼治霍亂吐利。及傷寒後發熱。水停喜唾者。

人參　乾薑　甘草　白朮各壹兩。

細末。蜜丸雞子黃大。每服一丸。百沸湯一盞。化令細。煎三五沸。溫服之。霍亂腳上築者不宜朮。可作湯去朮。加桂一兩半。水三升煎取八合。稍熱服之。吐甚去朮加生薑一兩半。作湯煎如前法。飲熱粥一椀。微溫覆之。勿發揭衣被。有寒腹滿痛。或四肢拘急。或下利轉筋。加生附子二枚。作湯服之。

治傷寒嘔吐欲死。生薑半夏湯。

半夏壹兩半。　生薑叁兩。

水三升半。煮一升。去滓。溫溫分四服。

治嘔吐發熱。脈滑數或洪者。茅根湯。

茅根半升。　麥門冬貳合半。　半夏壹兩。　人參半兩。

茯苓半兩。　生薑貳兩。

咬咀。水五升煎一升半。去滓。溫溫分減服。

霍亂口痛發熱。身疼多飲水者。宜五苓散。方在水證中。

傷寒發熱自利。脈浮大數。及鼻血或嘔者。宜黃芩芍藥湯

黃芩壹兩半。　芍藥　甘草各壹兩。

咬咀。水五升煮取一升半。去滓。分四服。嘔者加半夏一兩一分。生薑一兩半煎服。

治傷寒熱痢或兼腹痛。黃連當歸丸。

黃連　當歸（各叁兩）　乾薑　赤石脂（各壹兩）

細末。蜜丸梧桐子大。米飲吞下二三十丸。日三夜二服。

傷寒下利如爛肉汁。赤帶下。伏氣腹痛。諸熱毒悉主之薤白梔子湯。

豉（半升。綿裹）　薤白（壹握）　肥梔子（大者。柒個）

水三升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升去滓。下豉煮一升半。溫溫分減服。必解下惡積。

傷寒汗解。因飲酒復劇。苦煩悶乾嘔。口燥伸吟。錯誤不得臥。此藥解熱毒。除酷熱。不必飲酒劇者療。五日中神効。黃連黃蘗湯。

黃連（壹兩半）　黃芩　黃蘗（各壹兩）　肥梔子（拾貳個）

咬咀。水三升煎一升二合。去滓。溫溫分減服。未差更作。

傷寒四日而大下。熱利時作。白通諸藥多不得止。四順湯熱白通湯苦溫除熱止利。莫若黃連熟艾湯。

黃連　黃蘗（各壹兩半）　龍骨（壹兩）　熟艾（兩雞子大）

咬咀。水四升煮一升二合。去滓。分減溫服。

龐曰凡冷利皆宜四逆冷利臍下必寒水穀黃曰色或青黑也熱利臍下必熱利黃赤色也天行熱毒下利赤曰久下膿血及下部毒氣當下細蟲如布絲縷大或長四五寸黑頭銳尾宜麝香丸

麝香壹錢　附子　雄黃　丹砂　乾薑　巴豆各貳分

搗下篩訖煉蜜和丸小豆大米飲下二丸未知增之此方本无巴豆是古方脫去服之不効今增巴豆試之甚驗

傷寒後咳噫肉豆蔻湯

肉豆蔻壹個　石蓮肉炒　茴香各壹分　丁香半分

生薑　人參各貳分　枇杷葉伍片拭去毛炙

咬咀水三升煎至一升半分四服空心煖飲之

龐曰傷寒汗後咳噫不止是陰陽氣升降欲作汗升之不上降之不下故胃氣上逆而咳噫無休止者宜良薑方

橘皮　良薑　桂枝　當歸各壹分　麻黃半兩

檳榔參個　杏仁貳拾個　甘草壹分　生薑壹分　大棗拾個

咬咀水二升半煎至一升去滓下檳榔末又煎三沸去滓通口服一盞未已再一劑

時行頭痛心如醉狀面愛向黑處不欲見人此爲壞熱不散速行大青湯與服不爾狂走赶人大青湯

大青葉　秦艽　吳藍　升麻　薺苨
梔樓根各貳分　甘菊壹分　石膏叁分　竹瀝貳合　朴消三分

咬咀分二貼每服一貼水二升半煎至一升二合去滓下竹瀝朴消分温四服肉色黃加茵蔯六分面似火加梔子十四枚加水成三升煮取一升半温飲一盞

七八日熱盛不解苦葶藶湯

苦酒壹升半　苦葶藶壹合　生艾汁半升

同煎至七合作二服此療內熱病有牛黃一刀圭尤良阮河南曰今諸療疾多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有必欲求之轉以失時而苦參青葙葶藶子艾之屬所在盡有之除熱解毒最勝向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但少促其閒耳無不解者苦酒即米醋也

麗曰辛甜薑桂人參之屬是發散寒氣之藥其病未傳成內熱者爲調治之大要藥也決不可慮其酸苦之藥正治內熱病急要之藥也設當行辛甘而用酸苦設當行酸苦而用辛甘是昧於陰陽之用如此醫殺之耳其辛甘酸苦自是調治通行之要藥若論苦則忌甘論甘則忌苦雖有屢中誠爲粗工矣

傷寒發黃者先用瓜蒂末內鼻中口含水搐鼻中去黃水用五苓茵蔯散最良

時行一切。不知身上疼痛。不寒亦不熱。沉沉似有所思。順事多語。此藏正傳熱。麻人龍膽丸。服此藥不死。

大麻人　大黃各壹兩　柴胡　黃芩　白鮮皮　秦艽　赤芍藥　龍膽草各貳分　黃連壹分　梔子肆貳拾個

細末。蜜丸如梧桐子大。食後煎淡竹葉湯下三十丸。日與三服。以大利爲度。十日小差。壹月平復。

地黃湯。療傷寒及温病。應發汗而不與發汗。五內有瘀血者。及鼻衄吐血不盡。內熱瘀血面黃。大便黑者。此方主之。消化瘀血甚良。

生濕地黃肆兩　牡丹皮　芍藥　犀角屑無以升麻代各半兩

咬咀。水貳升。煮取壹升。去滓。温温飲一盞。喜忘如狂者。加地黃黃芩各三分。加水一升。脈大來遲。腹不滿。自言滿者爲無熱。不用黃芩也。

鼻衄或吐血。下血黃芩湯。

黃芩肆兩

咬咀。水三升。煮一升半。温飲一盞。兼治婦人漏下血不止。黃藥更佳。

吐血百治不差。此方療十差十。大黃散。

地黃汁半升　生大黃末壹方寸匕

煎地黃汁三沸下大黃末調勻空腹服之每溫飲一小盞日三服血卽止

熱病毒氣入眼赤痛生翳不見光明者大黃梔子湯

生大黃壹兩　升麻半兩　瞿麥　甘草各壹分　梔子柒個

咬咀水二升煎至一升去滓溫作四服以利爲度難利者煎藥畢下朴消二分和服先煮諸藥至一升半乃下大黃大黃先以水漬和水下之則折熱易利

治毒病入眼忽生赤翳或白或腫膚起或赤痛不得視光明入心肝或眼浮腫如吹汁出生膜覆珠子或內障不見物良由病後不愼酒麪炙煿五辛所致宜服此頻利之秦皮大黃湯

秦皮　柴胡　常山　黃芩　升麻　芍藥　白斂　枳實　甘草各半兩　大黃叁分

咬咀水叁升煮貳升下大黃再煎一升半去滓食後溫飲一盞熱盛者加焰消半兩湯成後下化勻服未差更作可至五七劑

又方滴眼湯斑豆瘡不宜用

秦皮　升麻　黃連各半兩

細剉水二升煎至一升綿包筋頭搦湯滴入眼中頻頻用之

下部蜃瘡雄黃散

雄黃　青箱子　苦參　黃連各參分　桃仁壹分

爲散以艾汁和丸棗核大綿包內下部蔕蓄汁更佳冬月無艾濃煎艾汁和爲丸更以米飲調下貳錢溫飲之日二服

治蜃瘡青黛丸

青黛　丁香　黃連等分

細末甘淀和丸棗核大口中有瘡含之咽汁若下部有瘡綿裹內下部日含化五六十丸差

牽馬丸治天行四五日下部生瘡醫所不能治此方主之

附子壹分　藜蘆　桂枝　巴豆各半兩去皮心炒黑

細末別研巴豆加蜜杵丸梧桐子大空心熱水下二丸未知加三丸熱在鬲上不下飲熱湯半升投吐之下部蜃自差神良

天行口瘡黃蘗升麻湯

黃蘗　升麻　甘草生半兩各

咬咀水一升半煮半升入地黃汁一合煎半升分二服細呷之

又方薔薇飲子

薔薇莖葉切一升（冬用根皮）

水三升煮半升温温漬之去涎。喉咽有瘡者。嚥汁少許爲佳。

又方黄蘗飲子

黄蘗薄切小片。蜜漬一宿。嚼蘗汁漬瘡、

又方五倍子散

五倍子炒爲末傅之涎出吐去。以差爲度。

傷寒喉中痛閉塞不通射干煎

生射干　豬脂（各半斤）

合煎分射干色微焦去滓。取壹裹大綿裹含稍稍嚥之。

治喉咽痛塞鵰砂散

鵰砂　殭蠶　牙消　白礬　甘草　雄黄（各壹分）

硇砂（半分）　草烏頭尖（肆箇）

細末。米飲調一錢。細細呷之。

古方黑龍煎治咽喉腫痛九種疾。

人參半兩　甘草壹兩　無灰酒壹升　不蚵皂角肆拾條

水三斗浸皂角一宿。淨鐺內煎。令水減半。次下人參甘草細切。又同煎三分耗二。布絞去滓。下酒更入釜煤一匕半。攪煎如餳稀。入瓷合內。埋地中一宿。若用時。取一丸如雞頭大。盞中以溫酒一呷化之。先以水漱口。以鵝毛點藥入喉中掃之。有惡涎或自出。或下腹。可兩三度。引藥方歇。良久令吐。候惡物出盡了。令喫少許水浸烝餅及軟飯粥壓之。次含甘草一寸嚥汁。忌炙煿胡餅豬肉淹藏等物。如木舌難下藥。以匙按舌。用藥掃喉中。

九般名

急喉閉　纏喉風　結喉　爛喉　重舌

木舌　遁蟲　蚵喋　飛系入喉

元祐五年。自春至夏秋。靳黃二郡人患急喉閉。十死八九。速者半日一日而死。黃州潘推官昌言親族中亦死數口。後得黑龍膏。救活者數十人。

龐曰。急切亦不候合。此膏用古方。以意處之。但得不蚵皂角一兩條。槌碎。水三升半浸。少時揉汁去滓。下草一分。人參一分。同煎作稀膏。勿令太稠。乃下後藥。

霜梅上白鹽　硇砂　烙消（各等分）

三味生研用前膏斟酌和勻可以掃得爲度每以鵝毛搨少許如前法掃喉中甚効其將息次第亦如前法此膏得力尤速若日久膏乾以甘草水化之病差後胸喉外生瘡勿疑無鹽梅以白鹽代

天行手足腫疼痛欲脫者濃煎虎杖汁漬之

天行後毒氣手足腫痛欲脫必作癰膿升麻大黃湯

升麻　木通　白斂（各叁分）　黃芩　芍藥（各壹兩）　甘草（半兩）　大黃（壹兩半）

㕮咀水叁升煮二升半下大黃煮一升半溫溫飲一盞利下爲度

傷寒勞復證

病新差後氣血津液衰耗愼勿爲諸勞動事凡言語思慮勞神梳沐澡頮勞力則生熱而復病如初也又新差後精髓枯燥切不可爲房事犯房事勞復必死魏督郵顧子獻病差後華敷囑之愼勿爲勞事餘勞尙可女勞卽死此是女勞復非陰陽易也素問云病熱而有所遺者是新差後腸胃尙弱若多食則難消化而復病如初也此是食復新差強人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

天行勞復頭痛四肢疼葱豉湯

葱白　豉（半升）

水二升半煎葱爛去滓入雄鼠屎三七枚末之和勻分再服未差更作。

天行勞復作熱且至晚則腰背痛頭項強重葛根薑豉湯

芍藥　生薑（各壹兩半）　豉　葱白（各貳合半）　葛根（貳兩）

㕮咀水三升煎二升下豉煎一升半去滓温飲一盞。

大病差後勞復枳實梔子湯。

枳實（壹分）　肥梔子（拾貳個）　香豉（半升）

漿水三升煮枳實梔至二升下豉煮一升半去滓温飲一盞温覆微汗食復者加大黄菜子大七枚。

同煎服之愈。

療傷寒已差勞復如初脈浮無汗者桂枝梔子湯（自汗者去麻黄）

梔子（拾貳個）　豉（半升）　桂枝　麻黄（各壹兩）

㕮咀水三升煎至二升下豉取一升半去滓温飲一盞温覆取小汗差。

療傷寒勞復如初自汗出者脈浮滑煩躁甚宜此方。

梔子石膏香豉湯

梔子（拾箇）　石膏（肆兩）　香豉（壹兩綿裹）

水三升先煮二味至二升半下豉煮取一升半去滓溫飲一盞（一法湯成入雄鼠矢二七枚末良）

病未平復後勞動致熱氣攻胸手足拘急搐搦如中風狀瓜蔞湯

瓜蔞根（肆兩黃脈者無）　淡竹茹（半斤）

水三升煮一升二合去滓日二三服溫與之

婦人病未平復因夫所動小腹篡中急痛腰胯疼四肢不任舉動無熱證者附子黃耆湯

白朮　當歸　桂枝　附子　甘草　芍藥

人參（各半兩）　黃耆（叁分）　生薑（壹兩半）

咬咀水四升煮至一升半去滓通口服一盞食久再服溫覆取小汗

男子勞房成復病鼠屎湯

薤根（壹升）　鼠屎（貳拾壹個爲末矢頭尖硬者是卽牡鼠也）

水三升半煮薤根至一升半去滓下鼠矢末再煎三沸溫飲一盞相次三服衣覆必有黏汗爲効未汗再作一劑兼治陰陽易神驗

男子房勞復發熱口噤臨死舌出數寸又始得病百節痛如被打渾身沉重恍惚失措脈促而絕不可治

或有吐涎不止。或有譫妄煩亂者。皆不可治。

天行差後。勞復發熱。嘔吐食不下。蘆根湯。

蘆根（半升） 生薑（貳兩） 橘皮 枇杷葉（各壹兩）

㕮咀。水三升煮一升半。去滓。溫飲一盞。大故心煩躁。加石膏貳兩。加水一升煮二升。

陰陽易證

陰陽易病者。陰陽相感動。其毒氣着人。如換易也。男子病新差。女子與之交。女子得病名曰陽易。女子病新差。男子與之交。男子得病名曰陰易。若二男二女則不相易。然女犯男得病。鮮有死者。男犯女得病。救稍緩則十無一人得生者。若女犯男。男自發勞復。則女不病。男犯女。女自發勞復。則男得病亦輕。富貴之家雖知其事。後生輕於自恣。犯之多致不救。田野之人。蒙蒙昧昧。只知傷寒能死人。因此病死者十有三四矣。皆不知其所犯之由深可傷也。男子女人陰陽易病。其狀身體疼痛。熱上衝胸。頭重不能舉。眼內生眵。四肢拘急。小腹絞痛。手足拳則皆死。其亦有不卽死者。若小腹裏急。熱上衝胸。頭重不欲舉。百節解離。經脈緩弱。血氣虛。骨髓竭。便吸吸。氣力轉少。着牀不得動。起止仰人。引歲月死。宜此方。足甲裩灰散。

取交接婦人手足甲二十枚。裩近隱處一尺。同燒灰。燒或米飲。調下二錢。日三服。陰頭微腫。小便利爲愈。若未愈。灸陰頭一百壯便差。陰頭在毛際間。提陰向上。當頭是穴。

女子陽易則取男子手足爪甲。椹近隱處。如前燒服之。可灸毛際橫空上中央曲骨。一穴百壯。男子陰易如前法灸。若陰卵縮未下。灸足大拇指旋毛上。小灶七壯。是大敦二穴。男女初得陰陽易病。便服薤根鼠矢湯。出汗有驗。

傷寒口乾喜唾方

大棗（肆拾枚・煮去皮尖・）　烏梅（肥者拾個・去核爲末・）

右以棗肉和爲丸。含化自然汁。